

NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Credelio 12 mg comprimés à croquer pour chats (0,5 – 2,0 kg)

Credelio 48 mg comprimés à croquer pour chats (> 2,0 – 8,0 kg)

Substance active :

Chaque comprimé à croquer contient :

| Credelio comprimés à croquer | lotilaner (mg) |
|------------------------------|----------------|
| pour chats (0,5 – 2,0 kg) | 12 |
| pour chats (> 2,0 – 8,0 kg) | 48 |

Espèces cibles

Chats.

Indications d'utilisation pour chaque espèce cible

Traitement des infestations par les puces et les tiques chez les chats.

Ce médicament vétérinaire assure une activité insecticide sur les puces (*Ctenocephalides felis* et *C.canis*) et acaricide sur les tiques (*Ixodes ricinus*) immédiate et persistante pendant 1 mois.

Les puces et les tiques doivent s'être attachées à l'hôte et avoir commencé leur repas pour être exposées à la substance active.

Ce médicament vétérinaire peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP).

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active, ou à l'un des excipients.

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles :

L'innocuité et l'efficacité du produit n'ont pas été évaluées chez des chatons âgés de moins de 8 semaines et sur des chats de moins de 0,5 kg. En conséquence, l'utilisation de ce médicament vétérinaire chez les chatons âgés de moins de 8 semaines ou pesant moins de 0,5 kg doit être basée sur l'évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

Effets indésirables

Espèces cibles : chats

| | |
|---|--------------------------|
| Très rare (<1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés): | Vomissement ¹ |
|---|--------------------------|

¹ disparaissent généralement sans traitement

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, soit à

l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir également la dernière rubrique de la notice pour les coordonnées respectives.

Voies d'administration et posologie

Voie orale.

Ce médicament vétérinaire aromatisé doit être administré conformément au tableau suivant, afin de garantir une dose unique de 6 à 24 mg de lotilaner par kg de poids corporel.

| Poids du chat (kg) | Dosage du comprimé et nombre de comprimés à administrer | |
|--------------------|---|----------------|
| | Credelio 12 mg | Credelio 48 mg |
| 0,5 – 2,0 | 1 | |
| > 2,0 – 8,0 | | 1 |
| > 8,0 | Combinaison appropriée de comprimés | |

Pour les chats de plus de 8 kg de poids corporel, utiliser une association appropriée de dosages disponibles pour obtenir la dose recommandée de 6 à 24 mg/kg.

Administrez le produit vétérinaire avec la nourriture ou dans les 30 minutes qui suivent le repas.

Pour une lutte optimale contre les infestations de tiques et de puces, le médicament vétérinaire doit être administré à intervalles mensuels et ce tout au long de la saison des puces et/ou des tiques en fonction des situations épidémiologiques locales.

Temps d'attente

Sans objet.

NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Elanco GmbH

NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/2/17/206/016–21

À usage vétérinaire. Médicament vétérinaire soumis à ordonnance.

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments.

08/2022